



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期														
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上							
B型肝炎	ユニバーサル	不活化		①	②					③														(注1)						
	母子感染予防		①	②							③																			
ロタウイルス	1価	生		①	②				(注2)																					
	5価		①	②	③				(注3)																					
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)	不活化			①	②	③																					(注4)			
5種混合 (DPT-IPV-Hib)	不活化			①	②	③																					7.5歳まで	15歳未満まで使用可能		
3種混合 (DPT)	不活化																									① (注5)	② 11-12歳 (注6)			
2種混合 (DT)	不活化																									① 11歳	12歳			
ポリオ (IPV)	不活化																									① (注7)				
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合	不活化			①	②	③																				④	(注8)			
4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合	不活化			①	②	③																				④	7.5歳まで	15歳未満まで使用可能		
BCG	生									①																				
麻疹・風疹混合 (MR)	生																									① (注10)	② (注9,10)			
水痘	生																									①	②	(注11)		
おたふくかぜ	生																									①	② (注12)			
日本脳炎	不活化																									① ② ③	7.5歳まで	④ 9-12歳		
不活化インフルエンザ	不活化																									生後6か月から接種可能	毎年 (10、11月などに) ① ②	13歳以上①		
経鼻弱毒生インフルエンザ	生																									2歳以上～19歳未満に	毎年 (10月、11月などに) ①	点鼻		
新型コロナ	mRNA																										製剤により使用できる年齢が異なる			
	不活化																													
ヒトパピローマウイルス (HPV)	9価	不活化																									(注13)	小6	中1① ② (注14)	中2～高1相当 (注15)
	2価・4価	不活化																									(注13)	小6	中1① ② ③ (注14)	中2～高1相当 (注15)
ワクチン	種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上							

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期